

1. 具有抑制 5-羟色胺及去甲肾上腺素再摄取作用，用于难治性抑郁症且疗效明显的抗抑郁药是

- A. 马普替林
- B. 阿米替林
- C. 西酞普林
- D. 文拉法辛
- E. 吗氯贝胺

答案: D

2. 可抑制 γ -氨基丁酸 (GABA) 降解或促进期合成的抗癫痫药是

- A. 卡马西平
- B. 苯妥英钠
- C. 地西洋
- D. 苯巴比妥
- E. 丙戊酸钠

答案: E

3. 长期应用不但加速自身代谢，而且可加速其他合用药物代谢的肝药酶诱导剂是

- A. 苯巴比妥
- B. 地西洋
- C. 唑吡坦
- D. 佐匹克隆
- E. 阿普唑仑

答案: A

4. 12 岁以下儿童禁用的非甾体抗炎药是

- A. 尼美舒利
- B. 阿司匹林
- C. 双氯芬酸
- D. 塞来昔布
- E. 美洛昔康

答案: A

5. 对血小板聚集及凝血机制无影响的药品是

- A. 罗非昔布
- B. 对乙酰氨基酚
- C. 吲哚美辛
- D. 阿司匹林
- E. 美洛昔康

答案: B

6. 痛风缓解期 (关节炎控制后 1~2 周)，为控制血尿酸水平，应选用的药品是

- A. 秋水仙碱

- B. 别嘌醇
- C. 布洛芬
- D. 泼尼松龙
- E. 聚乙二醇尿酸酶

答案: B

7. 哮喘急性发作首选的治疗药物是

- A. 短效 B₂ 受体激动剂
- B. 白三烯受体阻断剂
- C. 吸入性糖皮质激素
- D. 磷酸二酯酶抑制剂
- E. M 胆碱受体阻断剂

答案: A

8. 应用高剂量的 B₂ 受体激动剂可导致的严重典型不良反应是

- A. 低镁血症
- B. 低钙血症
- C. 低钾血症
- D. 高钙血症
- E. 高钾血症

答案: C

9. 氯吡格雷应避免与奥美拉唑联合应用，因为两者竞争共同的肝药酶，该肝药酶是

- A. CYP2B6
- B. CYP2C19
- C. CYP2D6
- D. CYP2E1
- E. CYP1A2

答案: B

10. 组胺 H₂ 受体阻断的抑酸作用强度比较，正确的是

- A. 法莫替丁 > 雷尼替丁 > 西咪替丁
- B. 西咪替丁 > 雷尼替丁 > 法莫替丁
- C. 雷尼替丁 > 法莫替丁 > 西咪替丁
- D. 雷尼替丁 > 西咪替丁 > 法莫替丁
- E. 法莫替丁 > 西咪替丁 > 雷尼替丁

答案: A

11. 2 岁以下儿童腹泻，禁用的药品是

- A. 双八面体蒙脱石散
- B. 双歧三联活菌胶囊
- C. 洛哌丁胺片
- D. 地衣芽孢杆菌胶囊

E. 口服补液盐

答案: C

12. 易发生持续性干咳不良反应的药品是

- A. 氢氯噻嗪
- B. 硝苯地平
- C. 福辛普利
- D. 硝酸甘油
- E. 利血平

答案: C

13. 监测他汀类药所致肌毒性的临床指标是

- A. 乳酸脱氢酶
- B. 尿淀粉酶
- C. 碱性磷酸酶
- D. 肌酸激酶
- E. γ -谷氨酰转移酶

答案: D

14. 治疗指数窄, 使用过程中应监测国际标准化比值 (INR), 并将期稳定控制在 2.0~3.0 的药品是

- A. 华法林
- B. 肝素
- C. 依诺肝素
- D. 氯吡格雷
- E. 达比加群酯

答案: A

15. 鱼精蛋白可用于救治

- A. 肝素过量导致的出血
- B. 吗啡过量导致的呼吸抑制
- C. 华法林过量导致的出血
- D. 异烟肼中毒导致的神经毒性
- E. 对乙酰氨基酚中毒导致的肝损伤

答案: A

16. 可拮抗华法林凝血作用的药品是

- A. 亚叶酸钙
- B. 维生素 B6
- C. 乙酰半胱氨酸
- D. 还原型谷胱甘肽
- E. 维生素 K1

答案: E

17. 可使血小板内环磷腺苷 (cAMP) 浓度增高而产生抗血小板作用的药品是

- A. 阿司匹林
- B. 氯吡格雷
- C. 双嘧达莫
- D. 替罗非班
- E. 噻氯匹定

答案: C

18. 患者, 男, 55 岁, 诊断为良性前列腺增生症, 服用非那雄胺片治疗, 最有可能发生与用药相关的不良反应是

- A. 体位性低血压
- B. 心悸
- C. 性欲减退
- D. 脱发
- E. 血压升高

答案: C

19. 不属于口服避孕药所致不良反应的是

- A. 突破性出血
- B. 低钙血症
- C. 增加血栓栓塞性疾病风险
- D. 月经失调
- E. 体重增加

答案: B

20. 某些慢性疾病使用泼尼松长期治疗, 为减少外源性激素对下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的抑制, 推荐的给药时间是

- A. 上午 8 时左右
- B. 中午 12 时左右
- C. 下午 4 时左右
- D. 晚餐前
- E. 睡前

答案: A

21. 患者, 男, 46 岁, 诊断为低钾血症, 心电图显示正常心律, 若外周静脉滴注氯化钾, 为防范局部疼痛及心脏停搏风险, 配制的适宜浓度是

- A. 低于 0.3%
- B. 0.3%~0.5%
- C. 0.5%~1.0%
- D. 1.0%~1.5%
- E. 高于 1.5%

答案: A

22. 长期、大剂量使用头孢菌素类抗菌药物, 可出现

低凝血酶原血症增加出血风险应及时补充的维生素是

- A. 维生素 A
- B. 维生素 C
- C. 维生素 D
- D. 维生素 E
- E. 维生素 K

答案: E

23. 可致光敏反应的抗菌药物是

- A. 克林霉素
- B. 美罗培南
- C. 阿米卡星
- D. 头孢哌酮
- E. 莫西沙星

答案: E

24. 属于时间依赖抗菌药物是

- A. 环丙沙星
- B. 阿奇霉素
- C. 阿米卡星
- D. 依替米星
- E. 头孢哌酮

答案: E

25. 患者, 女, 26 岁, 妊娠 3 个月, 因肺炎住院治疗, 应禁用的抗菌药物是

- A. 阿莫西林
- B. 头孢氨苄
- C. 青霉素 G
- D. 左氧氟沙星
- E. 阿奇霉素

答案: D

26. 搞病毒药阿昔洛韦在静脉滴注时滴速必须缓慢, 否则可能引起的不良反就百

- A. 急性肝衰竭
- B. 肺部纹理加重
- C. 急性肾衰竭
- D. 胰腺坏死
- E. 心功能不全

答案: C

27. 抗乙型肝炎病毒的药品是

- A. 伊曲康唑
- B. 利巴韦林

- C. 奥司他韦
- D. 拉米夫定
- E. 金刚烷胺

答案: D

28. 破坏疟原虫的生物膜及蛋白皮, 最终导致虫体死亡的搞疟药是

- A. 氯喹
- B. 伯氯喹
- C. 乙胺嘧啶
- D. 奎宁
- E. 青蒿素

答案: E

29. 治疗绦虫病的首选药品是

- A. 吡喹酮
- B. 伊维菌素
- C. 吡喹酮
- D. 伯氨喹
- E. 噻嘧啶

答案: C

30. 会加重奥沙利铂所致的严重神经系统毒性(感觉障碍、痉挛)的行为是

- A. 饮用热饮
- B. 日光浴
- C. 接触塑料制品
- D. 冷水浴
- E. 温泉浴

答案: D

31. 可以减轻环磷酰胺导致的膀胱毒性的药物是

- A. 亚叶酸钙
- B. 美司钠
- C. 二巯基丙醇
- D. 右雷佐生
- E. 硫代硫酸钠

答案: B

32. 可导致神经毒性(四肢麻木、腱反射消失)的抗肿瘤药是

- A. 柔红霉素
- B. 长春新碱
- C. 紫杉醇
- D. 博来霉素
- E. 环磷酰胺

答案：B

33. 属于抗雄激素类，可用于晚期前列腺癌治疗的首选药品是

- A. 他莫昔芬
- B. 托瑞米芬
- C. 氟他胺
- D. 乙烯雌酚
- E. 甲羟孕酮

答案：C

34. 散瞳药阿托品滴眼液的禁用人群是

- A. 青光眼患者
- B. 眼底检查者
- C. 虹膜睫状体炎患者
- D. 睫状肌麻痹患者
- E. 角膜炎患者

答案：A

35. 用于治疗鼓膜未穿孔的急性中耳炎、外耳道炎的药品是

- A. 过氧化氢溶液
- B. 酚甘油滴耳液
- C. 高锰酸钾溶液
- D. 苯酚溶液
- E. 碳酸氢钠滴耳液

答案：B

36. 鼻减充血药所致的典型不良反应是

- A. 心率减慢
- B. 血管舒张
- C. 血压升高
- D. 共济失调
- E. 面部潮红

答案：C

37. 关于硫磺软膏治疗疥疮的用法，错误的是

- A. 成人使用 10% 的软膏，儿童使用 5% 或 2.5% 的软膏
- B. 用药期间勤用热水洗澡
- C. 每晚涂药 1 次，疗程为 3~4 天
- D. 对顽固患者必需 3 个疗程方能根治
- E. 用药期间应避免接触铜制品

答案：B

38. 具有杀灭痤疮丙酸杆菌作用，用于治疗痤疮的药品是

- A. 维 A 酸
- B. 异维 A 酸
- C. 阿达帕林
- D. 过氧苯甲酰
- E. 克罗米通

答案：D

39. 外用糖皮质激素作用强度的比较，正确的是

- A. 地塞米松>氟轻松>卤米松
- B. 卤米松>地塞米松>氟轻松
- C. 地塞米松>卤米松>氯轻松
- D. 卤米松>氟轻松>地塞米松
- E. 氟轻松>卤米松>地塞米松

答案：D

40. 可用于治疗甲癣、足癣、体癣和股癣等浅表性真菌感染的药品是

- A. 氟胞嘧啶
- B. 伏立康唑
- C. 两性霉素 B
- D. 特比萘芬
- E. 卡泊芬净

答案：D

【41-43】

- A. 卡马西平
- B. 苯妥英钠
- C. 丙戊酸钠
- D. 苯巴比妥
- E. 氯硝西洋

41. 主要阻滞电压依赖性的钠通道，属于二苯并氮卓类抗癫痫药的是

答案：A

42. 减少钠离子内流而使神经细胞膜稳定，属于乙内酰胺类抗癫痫药的是

答案：B

43. 可激动 γ -氨基丁酸 (GABA) 受体和钠通道，属于苯二氮卓类抗癫痫药的是

答案：E

【44-45】

- A. 阿普唑仑
- B. 异戊巴比妥
- C. 地西洋

- D. 佐匹克隆
E. 苯巴比妥

44. 脂溶性较高，起效快，属于巴比妥类的镇静催眠药是

答案：B

45. 没有镇静和“宿醉”现象，不属于巴比妥类和苯二氮卓类的镇静催眠药是

答案：B

【46-47】

- A. 沙美特罗
B. 沙丁胺醇
C. 多索茶碱
D. 布地奈德
E. 噻托溴铵

46. 属于长效 B₂ 受体激动剂的平喘

答案：A

47. 属于长效 M 胆碱受体阻断剂的平喘药是

答案：E

【48-49】

- A. 右美沙芬
B. 氯化铵
C. 可待因
D. 苯丙哌林
E. 羧甲司坦

48. 具有成瘾性的中枢性镇咳药是

答案：C

49. 没有成瘾性，兼有中枢和外周镇咳作用的药品是

答案：D

【50-52】

- A. 雷尼替丁
B. 乳酸菌素
C. 前列地尔
D. 泽托拉唑
E. 铝碳酸镁

50. 【题干】适宜餐前嚼服的助消化药是

答案：B

51. 适宜睡前服用，用于一直“酸突破现象”的抑酸剂是

答案：A

52. 【题干】适宜餐前正片(粒)吞服，不可咀嚼或压碎的抑酸剂是

答案：D

【53-55】

- A. 甘油
B. 聚乙二醇 4000
C. 乳果糖
D. 比沙可啶
E. 硫酸镁

53. 【题干】属于容积性泻药的是。

答案：E

54. 【题干】属于渗透性泻药的是。

答案：C

55. 【题干】属于刺激性泻药的是。

答案：D

【56-58】

- A. 利多卡因
B. 索他洛尔
C. 美托洛尔
D. 硝酸甘油
E. 维拉帕米

56. 属于钠通道阻滞剂的抗心律失常药是

答案：A

57. 属于钙通道阻滞剂的抗心律失常药是

答案：E

58. 属于延长动作电位时程的抗心律失常药是

答案：B

【59-60】

- A. 依那普利
B. 替米沙坦
C. 哌唑嗪
D. 坦洛新（坦索罗辛）
E. 阿利克仑(阿利吉仑)

59. 属于肾素抑制剂的药品是

答案：E

60. 属于血管紧张素 II 受体阻断剂的药品是

答案：B

【61-63】

- A. 阿托伐他汀
- B. 非诺贝特
- C. 阿昔莫司
- D. 依折麦布
- E. 烟酸

61. 属于羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的是

答案: A

62. 属于胆固醇吸收抑制剂的是

答案: D

63. 属于贝丁酸类调节血脂药的是

答案: B

【64-65】

- A. 维生素 B1
- B. 维生素 B2
- C. 维生素 B12
- D. 依诺肝素
- E. 酚磺乙胺

64. 服用叶酸治疗巨幼红细胞贫血, 需同时联合使用的药品是

答案: C

65. 华法林起效缓慢, 深静脉栓塞治疗的初期, 需同时联合使用的是

答案: D

【66-67】

- A. 硫酸亚铁
- B. 重组人促红素
- C. 维生素 B12
- D. 人血白蛋白
- E. 非格司亭

66. 可升高红细胞, 用于肾性或非肾性贫血的药品是

答案: B

67. 【题干】可升高包细胞, 用于化疗所致的中性粒细胞减少症的药品是

答案: E

【68-69】

- A. 硝酸甘油
- B. 甲睾酮
- C. 非那雄胺

- D. 丙酸睾酮
- E. 克拉霉素

68. 与西地那非合用, 可导致严重低血压的药品是

答案: A

69. 可抑制 CYP3A4, 影响西地那非代谢的药品是

答案: E

[70-71]

- A. 酚妥拉明
- B. 度他醇胺
- C. 普适泰
- D. 特拉唑嗪
- E. 肾上腺素

70. 属于 α_1 受体阻断剂的抗良性前列腺增生症的药品是

答案: D

71. 属于 5α 受体还原酶抑制剂的抗良性前列腺增生症的药品是

答案: B

[72-73]

- A. 地特胰岛素
- B. 预混胰岛素
- C. 普通胰岛素
- D. 精蛋白锌胰岛素
- E. 低精蛋白锌胰岛素

72. 【题干】按作用时间分类, 属于超长效的胰岛素/胰岛素类似物的是

答案: A

73. 【题干】可供静脉注射的胰岛素/胰岛素类似物的是

答案: C

【74-76】

- A. 阿卡波糖
- B. 二甲双胍
- C. 那格列奈
- D. 艾塞那肽
- E. 吡格列酮

74. 那于 GLP-1 受体激动剂的是

答案: D

75. 属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的是

答案: A

76. 属于促胰岛素分泌剂的是

答案: C

【77-79】

A. 戊酸雌二醇

B. 他莫昔芬

C. 地屈孕酮

D. 依普黄酮

E. 司坦唑醇

77. 可用于慢性消耗性疾病的蛋白同化激素的是

答案: E

78. 可用于习惯性流产的药品是

答案: C

79. 可用于缓解绝经后更年期症状的药品是

答案: A

【80-81】

A. 氯化钾

B. 乳酸钠

C. 谷氨酸

D. 硫酸镁

E. 氯化铵

80. 可以碱化尿液, 用于代谢性酸中毒的药品是

答案: B

81. 可以酸化尿液, 用于代谢性碱中毒的药品是

答案: E

【82-83】

A. 碳酸钙

B. 三磷酸腺苷

C. 二磷酸果糖

D. 葡萄糖

E. 螺内酯

82. 用于治疗低磷血症的药物是

答案: C

83. 与胰岛素合用治疗高钾血症的药物是

答案: D

【84-85】

A. 头孢吡肟

B. 头孢美唑

C. 亚胺培南

D. 氨曲南

E. 拉氧头孢

对杆菌属类厌氧菌敏感, 属于头霉素

答案: B

属于碳青霉烯类

答案: C

【86-88】

A. 磷霉素

B. 替考拉宁

C. 利福平

D. 舒巴坦

E. 左氧氟沙星

86. 可抑制细菌 B-内酰胺酶的是

答案: D

87. 可抑制细菌 DNA 旋转酶的是

答案: E

88. 可抑制细菌的 DNA 依赖性 RNA 多聚酶的是

答案: C

【89-91】

A. 头孢氨苄

B. 头孢哌酮

C. 头孢吡肟

D. 头孢拉定

E. 头孢呋辛

89. 属于第二代头孢菌素的药物是

答案: E

90. 属于第三代头孢菌素的药物是

答案: B

91. 属于第四代头孢菌素的药物是

答案: C

【92-94】

A. 利奈唑胺

B. 头孢他啶

C. 头孢曲松

D. 罗红霉素

E. 头孢噻肟

92. 铜绿假单胞菌感染首选的抗菌药物是

答案: B

93. 耐甲氧西林金黄色葡萄菌感染宜首选的抗菌药物是

答案: A

94. 军团菌和支原体混合感染宜首选的抗菌药物是

答案: D

【95-97】

A. 甲氧氯普胺

B. 维生素 B6

C. 托烷司琼

D. 阿瑞吡坦

E. 西咪替丁

95. 属于神经激肽-1 受体阻断剂的止吐药是

答案: D

96. 属于多巴胺受体阻断剂的止吐药是

答案: A

97. 属于 5-HT₅ 受体阻断剂的止吐药是

答案: C

【98-100】

A. 毛果芸香碱

B. 甘露醇

C. 乙酰唑胺

D. 噻吗洛尔

E. 地匹福林

98. 属于 M 胆碱受体激动剂的降低眼压药是

答案: A

99. 属于 B 受体阻断剂的降低眼压药是

答案: D

100. 属于肾上腺素受体激动剂的降低眼压药是

答案: E

【101-103】

患者, 女, 56 岁, 血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常, 初诊医师建议首先改变生活方式(控制饮食、增加运动)。一个月后复查血脂水平仍未达标, 医师处方辛伐他汀片 20mg/d 治疗

101. 该患者服用辛伐他汀片的适宜时间是

A. 早上

B. 上午

C. 中午

D. 下午

E. 晚上

答案: E

102. 若采用强化治疗, 辛伐他汀片的最大日剂量是

A. 20mg

B. 40mg

C. 80mg

D. 100mg

E. 120mg

答案: C

103. 服药期间应监测血生化指标, 其中超过正常值上限 10 倍, 应立即停药的指标是

A. Hcy

B. Cr

C. CK

D. BUN

E. TBIl

答案: C

[104-106]

患者, 女, 55 岁, 临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下:

104. 关于本病例患者服用二甲双胍注意事项的说法, 错误的是

A. 可能出现的不良反应有腹痛, 腹泻, 腹胀

B. 服药期间不要饮酒, 以免引起低血糖

C. 若出现低血糖反应, 应立即饮用蔗糖水

D. 服药过程中适当补充维生素 B12

E. 若使用碘造影剂进行增强 CT 检查, 需提前停用二甲双胍

答案: C

105. 阿卡波糖最适宜的服用时间是

A. 餐前半小时

B. 餐时

C. 餐后半小时

D. 餐后 1 小时

E. 餐后 2 小时

答案: B

106. 该患者联合用药过程中，除监测血糖之外，还应重点监测的安全性指标是

- A. 血压
- B. 血脂
- C. 心功能
- D. 肺功能
- E. 肾功能

答案：E

[107-110]

患儿，男，5岁，体重25kg，有癫痫病史，青霉素过敏史。因急性胆囊炎合并腹腔感染住院治疗，体征和实验室检查：白细胞计数 $15.8 \times 10^9/L$ ，体温39.5，肝、肾功能正常，医师处方美罗培南静脉滴注（说明书规定儿童剂量为一次20mg/kg）

107. 患儿应用美罗培南的合理使用法是

- A. 0.5g, qd
- B. 0.5g, q12h
- C. 0.5g, q8h
- D. 0.5g, q4h
- E. 0.5g, god

答案：C

108. 若疗程较长，有可能导致维生素缺乏症，应适时补充的维生素是

- A. 维生素A
- B. 复合维生素B
- C. 维生素C
- D. 维生素D
- E. 维生素K

答案：E

109. 用药过程中，应密切监测的不良反应是

- A. 前庭神经功能障碍
- B. 承重关节损伤
- C. 日光性皮炎
- D. 视网膜神经炎
- E. 中枢神经系统症状

答案：E

110. 患儿用药过程中，若癫痫复发，不可选用的抗癫痫药是

- A. 丙戊酸钠
- B. 乙琥胺
- C. 地西洋

D. 左乙拉西坦

E. 氯硝西洋

答案：A

111. 属于阿司匹林禁忌的有

- A. 急性心肌梗死
- B. 上消化道出血
- C. 血友病
- D. 血小板减少
- E. 退行性骨关节炎

答案：BCD

112. 患者，男。因胃肠道平滑肌痉挛而致腹痛，来药店购买颠茄片，药师应提示顾客该药可能发生的不良反应有

- A. 口感
- B. 排尿困难
- C. 视力模糊
- D. 心率减慢
- E. 便秘

答案：ABCE

113. 可用于治疗心力衰竭的药有

- A. 血管紧张素转换酶抑制剂
- B. B受体阻断剂
- C. 醛固酮受体阻断剂
- D. 利尿药
- E. 强心苷

答案：ABCDE

114. 缓解非格司亭所致骨痛，可选择的药品有

- A. 碳酸钙
- B. 布洛芬
- C. 腺嘌呤
- D. 对乙酰氨基酚
- E. 葡萄糖酸钙

答案：BD

115. 属于抗血小板药品有

- A. 氯吡格雷
- B. 双嘧达莫
- C. 替罗非班
- D. 华法林
- E. 阿司匹林

答案：ABCE

116. 治疗甲状腺功能亢进症的药品有

- A. 丙硫氧嘧啶

啉

- B. 左甲状腺素片
- C. 甲巯咪唑
- D. 甲状腺片
- E. 卡比马唑

答案: ACE

117. 高脂饮食能促进吸收的维生素有 A. 维生素 A

- B. 维生素 C
- C. 维生素 D
- D. 维生素 E
- E. 维生素 K

答案: ACDE

118. 可能导致再生障碍性贫血的抗菌药有 A. 青霉素

- B. 氯霉素
- C. 甲砒霉素
- D. 头孢呋辛

E. 红霉素

答案: BC

119. 链霉素所致的毒性和不良反应 A. 耳毒性

- B. 肾毒性
- C. 加重重症肌无力症状
- D. 过敏反应
- E. 光毒性

答案: ABCD

120. 使用烷化剂类抗肿瘤药, 若发生药液外渗时, 救治措施包括 A. 药液渗漏时应停止给药

- B. 药液渗漏部位进行热敷
- C. 地塞米松+利多卡因局部注射
- D. 地塞米松+碳酸氢钠局部注射
- E. 氯化钠注射液+透明质酸酶局部注射

答案: ACDE