

1. 患者到药店购买“扑尔敏片”，药师应给予

A. 氯苯那敏片

2. 药库接受了一批药品，其中需要的冷处贮存的是

C. 双歧三联活菌胶囊

3. 将 0.5g 氨茶碱注射液加到 5% 葡萄糖注射液 250ml 中，临床要求给药速度是 60mg/h，输注速度是

C. 20ml/h

4. 细菌性脑膜炎患者应用万古霉素治疗，快速大剂量静脉滴注后可能产生

E. “红人综合征”

5. 应在餐前服用的药物是

D. 胶体果胶铋胶囊

6. 患者，男，54 岁，患者高血压、糖尿病和牙周炎，服用氢氯噻嗪、氨氯地平、二甲双胍、阿卡波糖和甲硝唑。该患者今日中暑服用藿香正气水(含有乙醇)出现面部的潮红、头痛、眩晕等症状。引起该症状的药物的配伍是

E. 甲硝唑和藿香正气水

7. 直接吞服可能导致患者窒息的剂型是

E. 泡腾片

8. 患者，男，身高 180cm，体重 90kg，腰围 100cm，其体重指数(BMI)是

C. 27.8

9. 下列不良事件中，属于假劣药世间的是

C. “亮菌甲素事件”

10. 患者，男，45 岁，患有高血压，因感冒发热、咽痛、流鼻涕到药店买药。药师不应推荐其使用的药物是

A. 复方酚咖伪麻胶囊

11. 患者，女，1 岁 6 个月，因感冒发热到医院就诊，医生处方对乙酰基酚滴剂，药师误发成对乙酰氨基酚片，患者家属拿到药店后不知如何使用，故询问药师，此事要是发现法错药了，针对该类型差错，有效的防范措施是

A. 采用电子处方系统

12. 患者，女，35 岁，在不知怀孕的情况下服用诺

氟沙星胶囊。经询问，获悉其服药时间距末次月经时间是 20 天。该用药行为对胎儿可能造成的影响是

B. 流产或发育成正常胚胎

13. 下列药物中服用后可在乳汁中分泌较多的是

D. 地西洋

14. 现代临床药物治疗更多依赖于循证医学的支持，在循证医学拒分级种，证据和推荐强度级别最高的是

C. 同质随机对照试验的系统评价

15. 患者，男，58 岁，患有高胆固醇血症，长期服用辛伐他汀 40mgqd，患有用药期间应定期监测的生化指标是

C. ALT

16. 患者，女，62 岁，患有 2 型糖尿病，平时未规律监测血糖，今日来院复诊，欲了解近 3 个月内血糖总体控制情况，应监测的指标是

B. 糖化血红蛋白

17. 患者，男，18 岁，因鼻塞症状加重就诊，医生处方 1% 盐酸麻黄滴鼻液。下列关于该滴鼻液用药的指导说法，错误的是

A. 萎缩性鼻炎患者可增加给药次数

18. 在药品零售企业应按照厨房要进行管理的泻药是

E. 酚酞片

19. 患者因股癣前来药店购药，不宜推荐的药物是

B. 氢化可的松软膏

20. 患者，女，临床诊断高甘油三质血症，给予非诺贝特微粒星胶囊治疗，正确的用法用量是

B. 0.2qd

21. 患者，男，70 岁，2 周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院，目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是

C. 阿司匹林

22. 治疗癫痫持续的状态，首选的药物是

E. 地西洋注射液

23. 患者，男，60岁，呈典型的“面具脸”、“慌张步态”及“小字症”表现，确诊为帕金森病，患者同时患有闭角型青光眼。不宜选用的治疗帕金森病的药物是

A. 左旋多巴

24. 阿尔茨海默病患者应避免使用的药物是

C. 颠茄

25. 对于有睡眠障碍的抑郁症患者，适宜选用的抗抑郁药是

C. 米氮平

26. 某患者因抑郁症用文拉法辛(75mgbid)治疗，用药7天后，下列药师用药指导意见，正确的是

E. 抗抑郁药多数需要至少2周才会有显著的情绪改善，建议继续服药

27. 患者，女，48岁，患有胃食管反流病，服用兰索拉唑治疗，近期诊断为高血压，血压160/90mmHg，为了避免加重食管反流症状，应避免适用的降压药是

E. 硝苯地平

28. 患者，女，21岁，未婚，患有甲状腺功能亢进症，应用丙硫氧嘧啶150mg tid治疗4个月后，出现体重增加、乏力、怕冷、突眼加重，治疗方案应调整为

B. 丙硫氧嘧啶减量并加甲状腺素片

29. 预混胰岛素30R的组成为

B. 70%中效胰岛素，30%短效胰岛素

30. 患者，男，65岁，患者骨质疏松症。根据该患者饮食习惯，每日需补充元素钙600mg。药师为其推荐碳酸钙(0.5g/片)，该患者适宜的用法用量是

A. 1片 tid

31—35 缺题

36. 患者，女，55岁，诊断为类风湿关节炎，既往有十二指肠溃疡病史。医生给予甲氨蝶呤+柳氮磺吡啶治疗。甲氨蝶呤用法用量正确的是

D. 7.5mgqw

37. 干扰素治疗乙型病毒性肝炎的禁忌症不包括

E. 消化性溃疡

38. 患者，男，67岁，因带状疱疹前来就诊。实验室检查肌酐清除率100ml/min。医生处方阿昔洛韦片治疗。对于该患者，适宜的用法用量是

A. 0.4g，每日5次

39. 围绝经期激素替代治疗应禁用的人群是

C. 6个月内有静脉血栓栓塞史的患者

40. 针对单纯严重乙醇中毒同时出现烦躁不安症状的患者，下列救治措施，错误的是

D. 静脉注射纳洛0.4mg和吗啡20mg

## 二、配伍选择题

41. OD是 A. 右眼

42. OS是 B. 左眼

43. OU是 E. 双眼

44. 与硫酸亚铁合用，可减少铁吸收的是 D. 奥美拉唑

45. 与左旋多巴合用，可提高效率的是 B. 苄丝肼

46. 与阿莫西林配伍，可提高治疗的是 C. 克拉维酸钾

47. 营养液中葡萄糖提供的能量是 C. 700kcal

48. 营养液中脂肪乳提供的能量是 B. 450kcal

49. 两种药物配伍容易形成白色沉淀的是 B. 头孢曲松与复方氯化钠注射液

50. 两种药物配伍之后效价降低的是 D. 青霉素与5%葡萄糖注射液

51. 在指导合理用药时，应交代宜在睡前服用的药物是 A. 辛伐他汀

52. 在指导合理用药时，应交代服药后限制饮水的药物是 E. 硫糖铝

53. 含有马兜铃酸的中药，可引起的典型药源性疾病是 C. 慢性肾衰竭

54. 甲状腺功能亢进患者服用丙硫氧嘧啶，可引起的典型药源性疾病是 A. 粒细胞减少症

55. 快速静脉滴注克林霉素，可引起的典型药源性疾病是 E. 呼吸抑制

56. 与阿米卡星合用会影响排泄导致急性肾损害的药物是 **D. 阿司匹林**

57. 与地西洋合用会影响其代谢导致镇静催眠作用增强的药物是 **C. 伏立康唑**

58. 与米诺环素合用会影响其吸收导致抗菌作用减弱的药物是 **B. 铝碳酸镁**

59. 患者，男，32岁，因细菌性扁桃体炎口服阿莫西林胶囊，出现全身瘙痒。立即停药，无特殊治疗，患者症状逐渐好转，未再给予阿莫西林的胶囊治疗，盖ADR的因果关系评估结果 **B. 很可能**

60. 患者，男，45岁，因慢性乙型肝炎给予干扰素治疗，治疗1个月后，患者出现脱发，停用干扰素后，脱发症状好转，再次给予干扰素治疗，患者再次出现脱发。该ADR的因果关系评价结果是 **A. 肯定**

61. 患者，男，43岁，因社区获得性肺炎入院，入院时9月8日查血常规提示：血小板(PLT)  $88 \times 10^9/L$ ，9月20日查血常规提示：血小板(PLT)  $92 \times 10^9/L$ ，患者既往血常规情况不详，该患者血小板减少与左氧氟沙星的因果关系评估结果是 **E. 无法评估**

62. 卡托普利属于 **D. D级**

63. 利巴韦林属于 **E. X级**

64. 头孢曲松属于 **B. B级**

65. 将药物治疗成本和所产生的效益归化为以货币为单位的数字，进行药物经济学评价，这一评价方法属于 **A. 成本—效益分析**

66. 以延长患者生命时间为指标开展的药物经济学评价方法属于 **B. 成本—效果分析**

67. 以质量调整生命年或者治疗调整预期寿命为指标开展的药物经济学评价方法属于 **D. 成本—效用分析**

68. 贫血患者常出现 **A. 血红蛋白减少**

69. 水痘患者出现 **E. 淋巴细胞增多**

70. 荨麻疹患者出现 **C. 嗜酸性粒细胞增多**

71. 从事驾车、高空作业的患者不宜服用的药物是 **B. 氯苯那敏**

72. 服药期间饮酒，最容易出现肝算上的药物是 **A. 对乙酰氨基苯**

73. 治疗口腔溃疡时，粘敷于溃疡，每处1片，一日不得超过3片的药物是 **C. 地塞米松黏贴片**

74. 治疗口腔溃疡时，涂于溃疡面上，连续2次，用于进食前暂时止痛的药物是 **E. 达克罗宁液**

75. 治疗口腔溃疡时，取少量吹敷于患处，一日用2—3次的药物是 **A. 冰硼咽喉片**

76. 瘙痒明显，阴道检查时发现黏稠的奶酪样分泌物，经验治疗首选的药物是 **B. 咪康唑**

77. 阴道检查时发现大量泡沫样分泌物，经验治疗首选的药物是 **A. 甲硝唑**

78. 阴道分泌物培养为衣原体，首选药物是 **E. 克拉霉素**

79. 治疗过敏性结膜炎可选用的药物是 **B. 色甘酸钠滴眼液**

80. 缓解视疲劳可选用的药物是 **D. 羟甲基纤维素滴眼液**

81. 该患者应慎用的药物是 **E. 异丙托溴铵气雾剂**

82. 应告知该患者用药后需漱口的药物是 **B. 布地奈德混悬液**

83. 患者，男，40岁，因肺结核使用抗结核药后，四肢出现针刺感，导致这种症状的药物是 **A. 异烟肼**

84. 患者平日佩戴隐形眼镜，使用抗结核后，导致患者隐形眼镜染色的药物是 **B. 利福平**

85. 高血压版前列腺增生患者适宜选用的药物是 **E. 特拉唑嗪**

86. 高血压伴痛风的患者慎用的药物是 **C. 氢氯噻嗪**

87. 患者，男，46岁，因心绞痛伴房颤。给予维拉帕米治疗，维拉帕米的禁忌症是 **B. 心力衰竭**

88. 患者，女，60岁，因心绞痛给予普萘洛尔治疗。普萘洛尔的禁忌是 **E. 哮喘**

89. 用于治疗铅中毒的特殊解毒剂是 **B. 青霉胺**

90. 用于治疗苯二氮卓类药物中毒的特殊解毒剂是 **A. 氟马西尼**

### 三、综合分析题

91. 关于本病历患者用药教育方法，错误的是

B. 酚麻美敏口服液与盐酸麻黄碱滴鼻液含有相同成分，应避免重复用药

92. 药师应向家属做用药交代，儿童应用对乙酰氨基酚混悬滴剂的注意事项是

C. 每天用药做多不用超过 4 次，用药不超过 3 天

93. 若该患者的肾功能正常，左氧氟沙星的给药剂量应为 B. 1 片 qd

94. 成年男性的肌酐清除率计算公式： $C_{cr} = (140 - \text{年龄}) \times \text{体重} / (0.814 \times Cr)$ ，成人女性的肌酐清除率为男性的 0.85。若该患者入院后查肾功能提示：血肌酐(Cr)  $120 \mu\text{mol/L}$ ，该患者的肌酐清除率约为

C.  $55\text{ml/min}$

95. 根据该患者计算所有的肌酐清除率，左氧氟沙星的剂量应调整为 D. 首剂 1 片半，此后每 48 小时 1 片

96—99 缺题

100. 药师对该患者的用药指导，错误的是

C. 若需减量，美托洛尔缓释片可掰开服用

101. 该患者对阿司匹林不耐受，可选用的替代药物是

C. 氯吡格雷片

102. 该患者治疗后出现肌肉酸痛，实验室检查提示：肌酸激酶(CK)  $2000\text{u/L}$ ，应考虑停用的药物是

E. 辛伐他汀片

103. 该患者化验结果同时显示血钾  $6.1\text{mmol/L}$ ，需要调整的药物是 C. 贝那普利片

104. 该患者降压治疗应首选的药物是 D. 拉贝洛尔

105—109 缺题

#### 四、多项选择题

110—113 缺题

114. 部分注射药物性质不稳定，遇光易变色，在地主过程中须避光的有

A. 尼莫地平注射液

B. 注射用硝普钠

E. 氧氟沙星注射液

115. 应告知患者服药后宜多饮水的药物有

A. 熊去氧胆酸

B. 阿仑膦酸钠

C. 苯溴马隆

D. 复发磺胺甲噁唑

116. 严重肝功能不全患者应避免选用的抗菌药物有

A. 米诺环素

C. 阿奇霉素

D. 庆大霉素

117. 为患者制定给药方案的基本方法有

A. 根据国际标准化比值(INR)调整华法林的给药剂量

B. 根据药物消除半衰期确定给药间隔

C. 根据治疗药物监测(TDM)结果指定给药方案

D. 根据平均稳态血药浓度和给要间隔确定给药剂量

E. 根据 PK/PD 参数制定抗菌药物给药方案

118. 患者，男，54 岁，因出现午后低热、乏力、盗汗就诊，诊断为肺结核，给予抗结核治疗，要是对患者的用药指导，正确的有

B. 应规律、全程用药

D. 注意消毒与隔离

E. 告知用药注意事项及不良反应

119. 老年患者多低血糖的耐受力差，治疗糖尿病时用首选不易导致低血糖反应的降糖药，下来降糖药中，单独使用不会出现低血糖的有

B. 二甲双胍

D. 阿卡波糖

E. 吡格列酮

120. 关于避孕措施和患者教育的说法，正确的有

A. 新婚期可选择复方短效口服避孕药

B. 复方短效口服避孕药一般停药后即可妊娠

C. 长效避孕药一般停药 6 个月后妊娠较安全

E. 绝境过渡期原来使用宫内节育器无不良反应应继续使用至绝经后半年再取出