

1. 根据中医理论，“症”“证”“病”含义不同，下列表述中属于“证”的是（C 气滞血瘀）
2. 根据阴阳理论，下列属阳的是（B 兴奋）
3. 具有助心行血作用的气称为（B 宗气）
4. 称为“十二经脉之海”的经脉是（D 冲脉）
5. 某女，22 岁，身体偏瘦，喜静，少动，其体质类型应该为（C 偏阴质）
6. 根据七情内伤致病理论，惊可导致（E 气乱）
7. 中医诊断可以分辨疾病性质的纲领是（C 寒热）
8. 执业药师复审方中发现有中成药不合理配伍，下列各组配伍中，属用药禁忌的是（D 附子理中丸与黄连上清丸）
9. 某男，39 岁。肛内肿物脱出，肛管紧缩坠胀疼痛，触痛明显。舌质暗红，苔薄白，脉细涩。中医辨证为内痔气滞血瘀证，治宜选用的方剂是（A 止痛如神汤）
10. 某男，25 岁。因腹泻就诊。症见腹痛肠鸣，泻下粪便臭如败卵，伴有未消化食物，泻后痛减，暖腐吞酸，不思饮食，舌苔厚腻，脉滑。治宜选用的方剂是（A 保和丸）
11. 安排饮片斗谱时，不能排于一斗或上下药斗中的是（D 乌头与天花粉）
12. 中药养护中吸湿防潮法可采用的干燥剂是（B 生石灰）
13. 罂粟壳中毒的典型症状是（D 瞳孔极度缩小）
14. 具有安神功能的藏药是（C 八味沉香散）
15. 处方调配与复核，应予以纠正的错付是（B 大腹子付牛蒡子）
16. 血清淀粉酶（AMS）活性增高最常见于（D 急性胰腺炎）
17. 某女，因产后恶露不停就诊，医师处方，当归 12g，川芎 9g，桃仁 9g，炙甘草 6g，炮姜 10g，益母草 15g 药师调配时，坤草应付（B 益母草）
18. 根据蒙药传统用药的“服药十则”，补养药的服用时间是（A 食前服）
19. 可参考麻痺辨证论治的西医疾病是（C 冠心病）
20. 某男，因患慢性心衰，长期服用强心苷类药物，现咽喉红肿疼痛，暗哑失声，下列中成药中，不宜与强心苷类药物同用的中成药是（A 六神丸）
21. 婴幼儿脏腑娇嫩，形体未充，下列关于婴幼儿用药原则的表述，错误的是（B 宜佐滋补之品）
- 22—28 缺题
29. 某男，大便下血，血色黯淡，四肢不温，面色萎黄，舌淡苔白，脉沉细无力。辨证为便血，脾胃虚寒证，医师处以黄土汤加减，方中宜煎汤代水的中药是（D 灶心土）
30. 临床使用不当可导致急性肾功能衰竭的中药是（D 马兜铃）
31. 根据常见病辨证论治的理论，咳嗽风寒犯肺证的主要症状是（D 咳嗽声重，痰稀色白）
32. 某男，35 岁，口腔黏膜溃疡，周边红肿，灼痛明显，每因过食煎炒辛辣食物而发，并伴口渴心烦，大便秘结，小便短黄，舌红，苔黄腻，脉数有力，治宜选用的方剂是（A 凉膈散）
33. 处方调复核时，应予以纠正的错付是（D 大腹子付牛蒡子）
34. 缺题
35. 某女，48 岁。夜不能寐，虚烦不安，健忘，盗汗，舌红少苔，脉细数。应采用的治法是（D 滋阴养血）
36. 能使氨基糖苷类抗生素排泄减少，吸收增加，易引起暂时性或永久性耳聋的中药是（C 硼砂）
37. 执业药师指导患者用药时，应首先考虑的原则是（B 安全）
38. 缺题
39. 某男，28 岁，因小便频数就诊，症见小便频数短涩，淋漓刺痛，小腹拘急引痛，其中医诊断是（C 淋证）
40. 临床使用清开灵口服液应特别监护的严重不良反应是（B 过敏性休克）
- 二、
41. 热邪亢盛可见（C 芒刺舌）
42. 脾肾阳虚可见（B 胖大舌）
44. 含糖分多的饮片，应贮存于（A 通风干燥处）
45. 炒至后的种子类饮片，应贮存于（D 密闭容器中）
46. 中药处方中含有竹沥水，正确使用方法是（E 兑服）
47. 中药处方中含有西红花，正确的使用方法是（A 另煎）
- 48—49 缺题
50. 轻粉中毒的主要临床表现是（B 恶心呕吐，口中有金属味，流涎，腹痛腹泻，口腔黏膜充血、牙龈肿胀溃烂）
51. 朱砂中毒的主要临床表现是（B 恶心呕吐，口中有金属味，流涎，腹痛腹泻，口腔黏膜充血、牙龈肿胀溃烂）
52. 乌头中毒的主要临床表现是（A 口舌、四肢及全身麻木，头痛、头晕，精神恍惚，牙关紧闭，呼吸衰弱）
53. 体虚多汗者忌用（E 麻黄）
54. 湿盛水肿者忌用（A 甘草）
55. 属风热感冒者，宜选用的方剂（B 银翘散）

56. 属实行感冒者，宜选用的方剂（E 清瘟解毒丸）
57. 属体虚感冒者，宜选用的方剂（D 参苏饮）
58. 肾虚可见（D 齿稀根露）
59. 血虚可见（C 牙龈淡白）
60. 胃火可见（E 齿龈红肿）
61. 需后下的饮片是（A 钩藤）
62. 需包煎的饮片是（B 海金沙）
63. 属肝肾阴虚者，宜选用的中成药是（D 杞菊地黄丸）
64. 属痰浊上蒙者，宜选用的中成药是（E 半夏天麻丸）
65. 属肝火上扰者，宜选用的中成药是（C 当归龙荟丸）
- 66—67 缺题
68. 宜与山药同贮的是（A 牡丹皮）
69. 宜与蛤蚧同贮的是（E 吴茱萸）
- 70—72 缺题
73. 属气血两虚者，宜选用的方剂是（B 圣愈汤）
74. 属肝不统脾者，宜选用的方剂是（A 固冲汤）
75. 气虚发热的症状特点是（D 长期低热，劳倦则甚）
76. 湿温潮热的症状特点是（B 午后热甚，身热不扬）
77. 阴虚内热的症状特点是（C 午后发热，五心烦热）
78. 因含有配伍禁忌中药而不宜合用的药组是（A 去痰止咳颗粒与镇咳宁胶囊）
79. 因含有相同有毒中药而不宜合用的药组是（E 天王补心丹与朱砂安神丸）
80. 煅龙骨与呋喃妥因联用能（C 增加药物排泄）
81. 陈皮与利福平联用能（D 减少药物排泄）
82. 藿香正气水与二甲双胍联用能（B 影响药物代谢）
83. 称为“贮痰之器”的脏是（A 肺）
84. 称为“生痰之源”的脏是（C 脾）
85. 不宜与麝香保心丸同时服用的药物是（D 地高辛）
86. 不宜与银银杏叶片同时服用的药物是（E 法莫替丁）
87. 不宜与人参鹿茸丸同时服用的药物是（B 阿卡波糖）
- 88—90 缺题
- 三、
91. 口舌生疮，舌尖红，病位在（A 心）
92. 脉数主病是（C 热证）
93. 该病的病位在（C 脾）
94. 中医辨证是（D 气血两虚）
95. 治宜选用的中成药是（C 乌鸡白凤丸）
96. 意思告知患者联合用药一定要了解药物的成分和作用。珍菊降压片是含有西药成分的中成药，所含降压药成分是（D 盐酸可乐定）

97. 医师进一步告知，珍菊降压片除含上述西药成分外，还含有（D 氢氯噻嗪）
98. 医师认为患者出现的症状与其自行加服珍菊降压片有关。珍菊降压片和呋达帕胺合用，最常用的不良反应有（C 低血钾）
99. 中医诊断是（C 胃痛）
100. 中医辨证是（D 寒凝气滞）
101. 宜选用的治法是（D 温中散寒）
102. 治宜选用的方剂是（A 良附丸加减）
103. 中医辨证是（B 气虚血瘀）
104. 中医治法是（C 益气活血）
105. 治宜选用的方剂是（B 补阳还五汤加减）
106. 治宜选用的中成药是（A 通心络胶囊）
107. 初诊见其舌苔黄腻，脉滑，治宜选用的中药是（B 藿香、薏苡仁）
108. 经一段时间调整，患儿症状又说改善，但仍觉神疲乏力，易感冒，多汗，舌质淡，此时宜选用的中成药是（A 黄芪、太子参）
109. 根据上述临床资料，该患者发生的不良反应是（D 胆汁淤积性肝炎）
110. 上述案例提示，为避免或减少壮骨关节丸不良反应的发生，在换着用药前，药师应进行用药指导，重点强调服药疗程、间隔时间以及相关检查。关于该药服用方法的描述，正确的是（B 疗程 30 天，间隔 15 天）
- 四、
111. 消灭病邪，防止邪气侵害的方法有（A 讲究卫生 B 使用药物 D 防范外伤）
112. 使用乌头类药物引起中毒的原因有（A 过量服用 B 泡酒服药 C 使用生品 D 煎煮时间太短 E 个体差异引起蓄积性中毒）
113. 关于中成药不合理用药的主要表现形式的说法，正确的有（A 药证不符 B 给药途径不当 C 给药剂量失准 D 疗程长短失宜 E 服药时间不当）
114. 在治疗疾病时，因人制宜需考虑的因素包括（A 年龄 C 性别 D 体质 E 生活习惯）
115. 某女，32 岁。头晕眼花，心悸多梦，面色苍白，爪甲舌淡，舌淡，苔薄白，脉细。治宜选用的中成药有（B 八珍颗粒 C 十全大补膏 E 当归补血口服液）
116. 因富含鞣质，与乳酶生等含酶制剂联用是会产生抑酶作用是会产生抑酶作用德中药有（A 诃子 C 地榆）
117. 执业医师对医师开展用药咨询服务的内容包括（A 新药信息 B 合理用药信息 C 药物相互作用和禁忌证 D 药品不良反应信息）
118. 根据五行相生规律确立的治法有（B 培土生金）

法 C 滋水涵木法 D 金水相生法 E 益火补土法)

119. 老年慢性病患者长期服用中药注意的事项有 (A 从最小剂量开始 B 辨证用药, 严格掌握适应病证 C 对体质较弱的患者不随意加药 D 服用多种药物时, 注意药物相互作用, 间隔服药)

120. 饮片处方调剂复核的主要内容有 (A 有无虫蛀、霉变 B 毒麻药有无超量 C 计量误差是否在允许范围内 D 特殊煎法的药味是否单包 E 有误差味、漏味、多味、异物)

中药调剂学